

O que aconteceu?	Sinais e Sintomas	Sinais de Gravidade	Diagnóstico Provável	Onde Ir	O que Fazer O que NÃO fazer
Um inseto entrou no ouvido	Criança agitada pelo barulho gerado pelo inseto ou batimento de asas Coceira Dor	Dor intensa que não passa. Sangramento Zumbido constante	Corpo estranho com ou sem otite externa por consequência. Alguns insetos podem colocar larvas (miíase)	Marcar consulta com otorrino. Ir a uma emergência se houver sinais de gravidade.	Caso o inseto esteja vivo, pingar algumas gotas de óleo no ouvido, para paralisá-lo. Não tentar remover com pinça.
Corpo estranho inerte no ouvido, identificado imediatamente ou tardiamente	Sensação de ouvido tampado Coceira Saída de secreções. Atenção: As crianças podem não confessar o que ocorreu.	Dor intensa que não passa. Sangramento. Vertigens, zumbido, paralisia facial. Saída de secreção com sangue.	Ferimento no conduto auditivo externo ou mais profundo em caso de vertigem ou paralisia facial.	Marcar consulta com otorrino. Ir a uma emergência se houver sinais de gravidade.	Não tentar extrair sozinho (geralmente só conseguirá empurrar ainda mais profundo). Não deixar entrar água no ouvido.
FONTE:	Estas orientações são baseadas no site www.orlfrance.org , redigidas por médicos otorrinolaringologistas franceses, adaptadas a realidade brasileira por uma médica otorrinolaringologista e não substituem a necessidade de avaliação médica.				