

O que aconteceu?	Sinais e Sintomas	Sinais de Gravidade	Diagnóstico Provável	Onde Ir	O que Fazer O que NÃO fazer
Durante ou após um resfriado ou rinofaringite	Saída de pus ou secreção esverdeada Febre Dor	Projeção da orelha para a frente Dor que não deixa dormir Secreção com cheiro forte Febre alta	Otite média aguda ou Mastoidite	Pediatra ou Otorrino. Procurar a emergência se houver sinais de gravidade	Analgésicos e antitérmicos Não colocar água nem remédios em gotas nos ouvidos.
Ele tem tubo de ventilação (carretel) nos ouvidos ou perfuração timpânica já conhecida.	Secreção com aspecto de pus Dor		Possibilidade de infecção	Marcar consulta com otorrino para aspiração	Não deixar entrar água nem colocar remédio em gotas nos ouvidos antes de ir ao médico.
Após mergulho ou machucado com cotonete	Secreção com aspecto de pus Dor		Possível otite externa aguda	Pediatra ou Otorrino	Interromper exposição a água. Não usar cotonetes nem colocar remédio em gotas nos ouvidos antes de ir ao médico
Ele usa aparelho auditivo	Secreção com ou sem dor		Possível otite externa aguda	Marcar atendimento com otorrino	Retirar o aparelho auditivo. Não deixar entrar água nos ouvidos.
Sem razão aparente	Sem dor Sensação de ouvidos "tampados"		Rolha de cera ou Corpo estranho	Marcar consulta com otorrino	Não usar cotonetes
FONTE:	Estas orientações são baseadas no site www.orlfrance.org , redigidas por médicos otorrinolaringologistas franceses, adaptadas a realidade brasileira por uma médica otorrinolaringologista e não substituem a necessidade de avaliação médica.				